

**Uso:** Externo

**Fator de Correção:** Não se aplica

**Fator de Equivalência:** Não se aplica

**PM:** 412,52g/mol

**FM:** C<sub>28</sub>H<sub>28</sub>O<sub>3</sub>

## ADAPALENO RETINÓIDE

### Indicação

O **Adapaleno** é uma molécula derivada do ácido naftóico, com propriedades biológicas similares às do ácido retinóico. Suas propriedades farmacológicas lhe conferem a habilidade de controlar a proliferação e diferenciação celular, prevenir e eliminar comedões. Também apresenta eficiente atividade antiinflamatória na acne. É indicado para o tratamento tópico da acne vulgaris. Tem-se mostrado mais eficaz quando usado concomitantemente com a clindamicina. O **Adapaleno** promove a renovação celular da pele, de forma menos agressiva que o ácido retinóico.

### Recomendação de uso

Creme, gel e loções a 0,1%.

É aplicado uma vez ao dia, após higienização e antes de dormir. Em algumas circunstâncias, quando o paciente apresenta irritação da pele, a aplicação pode ser feita em dias alternados até que a irritação cesse.

### Contra indicações

Não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Também é contra-indicado o uso em pacientes hipersensíveis à substância. Não deve ser usado simultaneamente a outros retinóides.

### Efeito Colateral ou Adverso

O **Adapaleno** pode provocar coceira, vermelhidão, descamação e queimação em alguns pacientes; nestes casos, recomenda-se a suspensão temporária do medicamento até que a pele se acostume. Deve-se evitar o contato do produto com as mucosas.

**Obs:** Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA - Lista-C2.

### Referências Bibliográficas

1. BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/SP:Tecnopress, 4<sup>a</sup> Ed. 2011.
2. WEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2<sup>a</sup> Ed. 2005.
3. <http://pt.wikipedia.org/wiki/Adapaleno> (consultado em 08.01.2009).

Última atualização: 07/08/2013 MJD  
12/11/2015 AM