

**Uso:** Interno

**PM:** 313,87

**Fator de Correção:** Não se aplica

**FM:** C<sub>20</sub>H<sub>23</sub>N.HCl

**Fator de Equivalência:** 1,0

## **AMITRIPTILINA HCL** **PSICOTRÓPICO**

### **Indicação**

Antidepressivo tricíclico para tratamento de depressão de todos os níveis. Inibe a recaptação neuronal da norepinefrina e de serotonina no SNC.

### **Recomendação de uso**

O **Cloridrato de Amitriptilina** é indicado em uma faixa de dosagem diária de 30 a 150mg. Inicialmente são administradas dosagens de 25mg, 3 vezes ao dia, podendo ser aumentada gradativamente até 50mg, 3 vezes ao dia. Em adolescentes e pacientes idosos, a dosagem usual é de 30 a 75mg ao dia, dividida em três tomadas ou em dose única ao deitar.

### **Efeitos Adversos**

Os efeitos adversos mais comuns são secura da boca, constipação, tonturas, zumbidos, dores de cabeça e sedação. Outros sintomas também descritos são aumento de apetite e ganho de peso.

### **Contra-indicação**

O **Cloridrato de Amitriptilina** não é indicado em pacientes com insuficiência hepática. Em razão da falta de experiência com este medicamento na terapia da depressão infantil, não se recomenda o uso em crianças.

**Obs:** Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA - Lista C1.

### **Referências Bibliográficas**

1. BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/SP:Tecnopress, 4ª Ed. 2011.
2. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE - Guia Completo de Consulta farmacoterapêutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.
3. ANFARMAG; MANUAL DE EQUIVALÊNCIA. São Paulo/SP, 3ª Ed. 2010.

*Última atualização: 08/08/2013 MJD.*

