

**Uso:** Interno

**CAS:** 120511-73-1

**Fator de Correção:** Não se aplica

**FM:** C<sub>17</sub>H<sub>19</sub>N<sub>5</sub>

**Fator de Equivalência:** Não se aplica

**PM:** 293,37

## ANASTROZOL ANTI NEOPLÁSICO

**Anastrozol** é um inibidor seletivo não-esteroidal da aromatase, diminui a concentração sérica de estradiol sem afetar os níveis de corticosteróides ou de aldosterona. É usado para o tratamento do câncer de mama inicial em mulheres na pós menopausa e tratamento do câncer de mama avançado.

Sua absorção é rápida e a concentração plasmática máxima aparece 2 horas depois de sua administração por via oral em jejum.

### Recomendação de uso

É administrado na dosagem de 1mg por dia, via oral.

### Reações adversas

Os efeitos adversos mais frequentes com o uso do **Anastrozol** são alterações gastrintestinais, como anorexia, náuseas, vômitos e diarreias. Podem ocorrer sonolência, cefaleias, erupções cutâneas, secura vaginal.

### Precauções

Não é recomendado o uso em crianças. Deve-se avaliar o risco/benefício em pacientes com insuficiência hepática ou renal severa.

### Interações

Tamoxifeno e/ou outros tratamentos com estrogênio não devem ser administrados concomitantemente com **Anastrozol**, porque eles podem diminuir sua ação farmacológica.

### Contra indicações

O uso de Anastrozol é contra indicado durante a gestação ou lactação.

### Referências Bibliográficas

1. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE - Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.
2. <http://www.bulas.med.br/bula/172897/anastrozol.htm> - Acesso em 10/12/2013

Última atualização: 27/06/2017 BM.