

Uso: Interno

CAS: 145040-37-5

Fator de Correção: Não se aplica

FM: C₃₃H₃₄N₆O₆

Fator de equivalência: Não se aplica

PM: 610,7

CANDESARTAN CILEXETIL

ANTI-HIPERTENSIVO

Propriedades

O Candesartan Cilexetil é um pró-fármaco rapidamente convertido à droga ativa Candesartan, que é um antagonista do receptor da angiotensina II, com ações similares ao losartan.

Indicações

O Candesartan Cilexetil é indicado para tratamento de hipertensão (hipertensão arterial leve, moderada e grave). Utiliza-se também no tratamento de insuficiência cardíaca.

Recomendação de uso

A dose inicial de Candesartan Cilexetil é de 8mg uma vez ao dia, ajustando-se conforme a resposta do paciente, com doses máximas diárias de 16mg uma vez ao dia. O efeito anti-hipertensivo máximo é atingido dentro de 4 semanas após o início do tratamento. Para tratamento de pacientes com alterações renais e hepáticas deve ser considerada uma dose inicial de 4mg ao dia.

Reações adversas

As reações adversas avaliadas durante o tratamento da hipertensão foram moderadas e transitórias. As mais comumente observadas foram hipotensão, hipercalemia, alterações renais, aumento dos níveis de creatina, uréia e potássio.

Interações

O efeito anti-hipertensivo do Candesartan Cilexetil pode ser aumentado pelo uso concomitante com outros anti-hipertensivos. Durante a administração concomitante com de lítio, foram observados aumentos dos níveis séricos de lítio, sendo recomendada a monitoração em casos de tratamentos concomitantes.

Precauções

O Candesartan Cilexetil deve ser evitado em casos de hipersensibilidade ao ativo, gravidez e lactação.

Bibliografia

1. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE - Guia Completo de Consulta farmacoterapêutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.
2. DEF- Dicionário de Especialidades Médica, 2009/10. Editora de Publicações Científicas LTDA.

Última atualização: 17/07/2017 BM.