

USO: Externo

Fator de Correção: De acordo com o teor do laudo.

Fator de Equivalência: 1,0

CAS: 130-26-7

FM: C9H5CINOI

PM: 305,49 g/mol

DCB: 02235

CLIOQUINOL

ANTI-PARASITÁRIO

Recomendação de uso

Dosagem usual de 3% de clioquinol na região afetada 2 a 4 vezes/dia.

Aplicações

- ✓ Tratamento de doenças cutâneas inflamatórias dos mais variados tipos e origem, proporciona alívio imediato e elimina sintomas como a coceira;
- ✓ Tinea pedis e infecções menores de pele, unhas e couro cabeludo;
- ✓ Úlcera dérmica;
- ✓ Pequenas infecções bacterianas da pele;
- ✓ Picadas e ferroadas de insetos com infecção secundária.

Mecanismo de ação

Antibacteriano e antifúngico tópico de amplo espectro, cujo mecanismo de ação não está ainda elucidado.

Contra indicações

Hipersensibilidade ao fármaco, aos derivados iodados e à cloroxina.

Reações adversas

Prurido, erupção cutânea, eritema, edema, irritação. Não foram observados efeitos adversos decorrentes de seu uso durante a gravidez e o aleitamento.

Precauções

É contra-indicado para uso oftálmico.

Referência Bibliográfica

1. Dicionário de especialidades farmacêuticas, 2016.

Última atualização: 19/07/2017 BM.