

USO: Interno

CAS: 57808-66-9

Fator de Correção: Não se aplica

FM: C₂₂H₂₄ClN₅O₂

Fator de Equivalência: 1,0

PM: 425,92

DCB: 03179

DOMPERIDONA ANTIEMÉTICO

A domperidona é um fármaco antagonista dos receptores de dopamina que age nos receptores D₂, utilizada como antiemético, sendo eficaz também no aumento da motilidade gastrointestinal. Clinicamente, eleva a pressão no esfíncter esofágico inferior (inibindo dessa forma o refluxo gastroesofágico), aumenta o esvaziamento gástrico e exacerba a peristalse duodenal.

Recomendação de uso

Adultos: 10mg a 20mg, 3 a 4 vezes ao dia; crianças: 0,25mg a 0,5mg/kg 3 a 4 vezes ao dia.

Aplicações

- ✓ Síndromes dispépticas;
- ✓ Refluxo gastroesofágico;
- ✓ Esofagite;
- ✓ Náuseas e vômitos.

Contra indicações

Intolerância à substância, administração concomitante com cetoconazol. Gravidez e lactação. Casos de insuficiência hepática ou paciente com alterações no ritmo cardíaco. Evitar o uso concomitante com outros antiácidos ou agentes antissecretores.

Reações adversas

Casos raros de dores de cabeça, sonolência, diarreia, erupção cutânea, urticária, cólica, aumento das mamas em homens. Casos especiais de pacientes tratados anteriormente tratados com neurolépticos podem apresentar espasmos musculares localizados ou generalizados.

Referência Bibliográfica

1. Rang HP et al. Farmacologia.
2. <https://www.tuasaude.com/domperidona-motilium/>
3. <http://www.cff.org.br/pagina.php?id=500>
4. <http://www.minhavidacom.br/saude/bulas/68-domperidona-suspensao>
5. DEF – Dicionário de Especialidades Farmacêuticas 2016, 44ª Ed.

Última atualização: 12/01/2017 BM

