

Uso: Interno

Fator de Correção: Não se aplica

Fator de Equivalência: Não se aplica

EXEMESTANO

É indicado para o tratamento adjuvante (auxiliar) em mulheres pós menopausadas com câncer de mama inicial, para diminuir a chance da doença recorrer (voltar) e também para reduzir o risco de desenvolvimento de câncer na outra mama. Exemestano é indicado também para o tratamento de segunda linha (depois da falha do tratamento inicial) do câncer de mama avançado em mulheres pós menopausadas, cuja doença progrediu após tratamento hormonal. E também é indicado para o tratamento de terceira linha (depois da falha da segunda linha) do câncer de mama avançado em mulheres pós menopausadas cuja doença progrediu após tratamento com: antiestrógenos (bloqueadores do estrógeno; tipo de hormônio feminino) e/ou inibidores não esteroides da aromatase (bloqueador de enzima produtora de estrógeno) ou progestágenos (semelhante a progesterona; tipo de hormônio feminino).

Recomendação de uso

25 mg uma vez ao dia preferencialmente após as refeições.

Mecanismo de ação

Exemestano inibe o crescimento de tumores através do bloqueio da produção de estrogênio (hormônio feminino).

Contraindicações

Não deve ser utilizado em mulheres pré-menopausadas (antes da menopausa) e também não deve ser utilizado juntamente com medicamentos que contêm estrógenos (hormônio feminino), pelo risco de anular sua atividade. Pode causar diminuição da densidade mineral óssea (grau de dureza do osso). Durante o tratamento adjuvante (auxiliar) com Exemestano mulheres com osteoporose (diminuição da dureza dos ossos) ou com risco de osteoporose devem realizar avaliações da densidade mineral óssea por densitometria óssea (tipo de RX dos ossos) no início do tratamento. Exemestano pode comprometer a capacidade de dirigir e operar máquinas. É contraindicado a gestantes ou lactantes.

Efeitos adversos

As reações adversas mais frequentemente relatadas incluíram rubor (vermelhidão), artralgia (dor nas articulações), fadiga (cansaço) e náusea (enjoo). Foram relatadas também sonolência, astenia (fraqueza) ou tontura com o uso deste medicamento.

Referências bibliográficas

1. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE - Guia Completo de Consulta farmacoterapêutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.
2. DEF- Dicionário de Especialidades Médica, 2009/10. Editora de Publicações Científicas LTDA.

Última atualização: 17/07/15 BP.