

**Uso:** Interno

**CAS:** 146-56-5

**Fator de Correção:** Não se aplica

**PM:** 510,4

**Fator de Equivalência:** 1,0

**FM:** C<sub>22</sub>H<sub>26</sub>F<sub>3</sub>N<sub>3</sub>OS. 2HCl

## FLUFENAZINA HCL PSICOTRÓPICO

### Indicações

A **Flufenazina** se utiliza para tratamento de diversos transtornos psiquiátricos, como a esquizofrenia, ansiedades graves, transtornos de comportamento e para tratamento de manias, em casos de transtorno bipolares.

Administra-se por via oral, na forma de cloridrato.

### Recomendação de uso

A dose usual inicial de **Flufenazina HCl** é de 2,5 à 10mg/dia, divididos em 2 ou 3 tomadas, por via oral. A dose para o tratamento pode aumentar até 20mg/dia. Para idosos não são recomendadas doses maiores que 10mg/dia.

As doses podem reduzir-se posteriormente para uma dosagem de manutenção, de 1 à 5mg/dia.

### Reações Adversas

A **Flufenazina** pode apresentar efeitos adversos como xerostomia, tremores, dificuldade de micção, visão embaçada, entre outros menos comuns. É menos propensa a causar sedação, hipotensão e efeitos antimuscarínicos, porém tem maior incidência de causar efeitos extrapiramidais.

### Precauções

A **Flufenazina** pode exacerbar a depressão, portanto está contra indicada em pacientes com depressão grave. Deve ser utilizada com cautela em pacientes com insuficiência hepática, renal, cardiovascular, com diabetes e função respiratória deficiente.

### Interações

As interações mais conhecidas devem-se a sua administração com fármacos com ação farmacológica semelhante. Os sintomas de depressão do SNC podem potencializar-se com o uso de outros fármacos depressores do SNC, álcool, anestésicos em geral, hipnóticos, ansiolíticos e opióides.

**Obs:** Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA – Lista C1.

### Referências Bibliográficas

1. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.

Última atualização: 20/08/2013 MJD

