

Uso: Interno/ Externo

Fator de Correção: Não se aplica

Fator de Equivalência: 1,0

IOIMBINA VASODILATADOR

Indicação

Ioimbina é um estimulante sexual masculino. Um alcalóide obtido do yohimbe (*Pausinystalia yohimbe*) que pertence à classe farmacológica dos bloqueadores alfa-adrenérgicos. Indicado para impotência sexual masculina. Por ser vasodilatador, melhora a circulação local e pode ser utilizado como adjuvante no tratamento da celulite.

Recomendação de uso

Usada de 6 a 18mg/dia, em doses divididas.

Pode ser ingerido até 30mg/dia.

Para uso externo, é usada nas concentrações de 0,5 a 2,0%.

Ocorrendo efeitos colaterais a dose deve ser reduzida, sendo gradativamente ajustada.

Excipientes

É indicada associação com os seguintes excipientes: lactose, estearato de magnésio, aerosil e celulose microcristalina.

Contra indicações

Contra indicado em pacientes com úlcera, doenças renais ou cardíacas; contra indicado com uso concomitante com anti-hipertensivo clonidina, tranquilizantes e antidepressivos. É também contra indicado para gestantes e crianças.

Ioimbina – opções para tratamento da disfunção erétil

A **Ioimbina** bloqueia os receptores α_2 -adrenérgicos pré-sinápticos. Sua ação vasodilatadora periférica se assemelha aquela observada com a reserpina, embora mais fraca e de menor duração. O efeito da **Ioimbina** sobre o sistema nervoso autônomo periférico é o aumento da atividade parassimpática (colinérgica) e a diminuição da atividade simpática (adrenérgica). No desempenho sexual masculino a ereção está ligada à atividade colinérgica e ao bloqueio α_2 -adrenérgico, os quais podem resultar em aumento do tônus peniano, diminuindo o esvaziamento do fluxo no pênis ou ambos. A **Ioimbina** produz vasodilatação do corpo cavernoso pelo efeito alfa-antagonista.

Ioimbina - veterinária

A **Ioimbina** é indicada para reverter o efeito da xylazina em cães. Pode ser encontrada nas formas farmacêuticas injetáveis IM e IV (Plumb.D.C.,2002). A administração oral em animais também pode ser feita, sob forma de cápsulas ou biscoitos medicamentosos. Segue abstract com a administração oral de **Ioimbina** para cachorros.

A eficácia da **Ioimbina** como antídoto foi avaliada em um estudo com 8 cães com dermatoses generalizadas e 5 cães com sarna foram tratados com 1,25% de solução de amitraz aplicada semanalmente associado com tratamento com antídoto (atipamezol-0,1mg/Kg I.M. uma vez e Ioimbina 0,1mg/Kg uma vez ao dia por 3 dias, via oral). Alguns efeitos colaterais foram observados porém cessaram com o tratamento com antídoto. O resultado foi eficaz.

Ioimbina é utilizada como lipolítico tópico à 0,5 à 2,0% em cremes para uso tópico, e também em mesoterapia.



Referências Bibliográficas

1. Formulário Eletrônico - Dr. Anderson de Oliveira Ferreira.
2. DEF - 2004/2005
3. PR Vade Mecum - 2004/2005



0800 707 0706

www.infinitypharma.com.br