

**Uso:** Interno

**CAS:** 16676-29-2

**Fator de Correção:** Não se aplica

**FM:** C20H23NO4.HCl

**Fator de Equivalência:** Não se aplica

**PM:** 377,86

## NALTREXONA HCl ANTIALCOOLICO

### Propriedades

A **Naltrexona** é um antagonista de opióides, utilizado na forma de cloridrato, em cápsulas de uso oral.

### Indicações

A **Naltrexona** é indicada no tratamento do alcoolismo e no tratamento de dependência de opióides.

O alcoolismo é uma doença devastadora, de profundo impacto na Saúde Pública. Devido ao grande impacto da doença, em 1995 o FDA aprovou o uso da **Naltrexona** como um antagonista dos receptores opióides.

O tratamento com **Naltrexona** não deve ser iniciado até que o paciente esteja desintoxicado, e sem o uso de opióides por pelo menos de 7 a 10 dias.

### Recomendação de uso

Na forma oral, um tratamento se inicia com uma dose de 25mg. Caso não apareçam sinais de abstinência, a dose deve ser aumentada para 50mg por dia.

A dose de manutenção do cloridrato de **Naltrexona** é de 350mg por semana, sendo administrados 50 mg diários.

### Reações adversas

A utilização da **Naltrexona** pode provocar dificuldades para dormir, perda de energia, ansiedade, euforia, dor abdominal, náuseas, vômitos, perda de apetite, dor nas articulações e músculos e cefaléia.

Doses elevadas de **Naltrexona** podem causar lesão hepatocelular.

### Precauções

A **Naltrexona** deve ser evitada em pacientes que fazem uso terapêutico de opióides, pois podem desencadear uma síndrome de abstinência aguda.

Os sintomas de abstinência podem ocorrer a partir dos primeiros 5 minutos até 48 horas após a administração.

Deve administrar com precaução a **Naltrexona** em analgesia, pois existe maior risco de depressão respiratória e efeitos adversos.

A **Naltrexona** deve ser administrada com precaução em pacientes com transtornos hepáticos, hepatites agudas e insuficiência hepática. Também deve ser administrada com precaução para pacientes com insuficiência renal.

**Obs:** Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA – Lista C1.

### Referências Bibliográficas

1. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.
2. John H. Krystal, M.D., et al; NALTREXONE IN THE TREATMENT OF ALCOHOL DEPENDENCE, For the Veterans Affairs Naltrexone Cooperative Study 425 Group N Engl J Med 2001; 345:1734-1739 December 13, 2001

Última atualização: 20/08/2013 MJD