

USO: Interno

CAS: 22204-53-1

Fator de Correção: N.A.

FM: C14H14O3

Fator de Equivalência: 1,00

PM: 230,26

NAPROXENO BASE

ANTI-INFLAMATÓRIO ESTERÓIDE

Naproxeno base é um fármaco da classe dos anti-inflamatórios derivado do ácido propiônico.

Apresentação

Pó cristalino branco a quase branco praticamente inodoro.

Recomendação de uso

É recomendado o uso de 500mg a 1g /dia, a dose, podendo ser dividida em 1 ou 2 tomadas.

Indicações

- ✓ Distúrbios musculoesqueléticos;
- ✓ Dismenorreia;
- ✓ Dor aguda pós-operatória;
- ✓ Crises agudas de gota;
- ✓ Enxaqueca;
- ✓ Distúrbios do tecido mole.

Mecanismo de ação

O naproxeno tem ação analgésica, antipirética e anti-inflamatória, pois inibe de forma reversível a síntese de prostaglandinas. Portanto, é um inibidor COX não seletivo. O Naproxeno base alivia a dor, reduz a febre e a resposta inflamatória.

Reações adversas.

Reações mais frequentes são as gastrointestinais: epigastralgia, náuseas, vômitos, dor abdominal.

Precauções

É contra-indicado para pacientes que apresentam úlcera péptica ativa. Atravessa a barreira placentária e aparece no leite.

Interações Medicamentosas.

A administração concomitante de anticoagulantes orais deve ser feita com cautela (risco hemorrágico).

Armazenamento

Conservar o produto em temperatura ambiente ao abrigo de luz e umidade.

Referência Bibliográfica

1. Bulário-ANVISA
2. Informações do fabricante.

Última atualização: 12/04/2017 SY.