

USO: Interno

CAS: 70458-96-7

Fator de Correção: De acordo com teor do laudo.

FM: C₁₆H₁₈FN₃O₃

Fator de Equivalência: 1,00

PM: 319,34

DCB: 06497

NORFLOXACINO ANTIMICROBIANO

O norfloxacinó é um antimicrobiano da classe das fluoroquinolonas de segunda geração, com amplo espectro de ação contra patógenos aeróbios gram-positivos e gram-negativos.

Recomendação de uso

400mg a cada 12 horas.

Aplicações

- ✓ Infecções do trato urinário alto ou baixo;
- ✓ Gastroenterites agudas bacterianas;
- ✓ Uretrite, faringite, proctite ou cervicite gonólicas;
- ✓ Febre tifoide.

Mecanismo de ação

Inibição da topoisomerase II (uma DNA-girase bacteriana), enzima que produz uma super-helicoidização negativa no DNA e permite a transcrição ou a replicação, bloqueando assim o metabolismo bacteriano, o que leva à eliminação do microrganismo.

Contra indicações

Pacientes com hipersensibilidade à substância ou outros quinólicos. Grávidas e lactantes.

Reações adversas

Dores de cabeça, pequenos distúrbios gastrintestinais, tontura e leve reação na pele.

Referência Bibliográfica

1. Rang HP et al. Farmacologia.
2. DEF – Dicionário de Especialidades Farmacêuticas.

Última atualização: 24/01/2017 BM