

Uso: Interno

Nome Químico: Cloridrato de Nortriptilina

Fator de Correção: Aplicar fator

PM: 299,87

Fator de Equivalência: 1,14

FM: C₁₉H₂₁N.HCl

NORTRIPTILINA HCL **PSICOTRÓPICO**

Indicação

A **Nortriptilina** é um antidepressivo tricíclico, indicado para tratamento e alívio dos sintomas da depressão. É administrada por via oral, na forma de **Cloridrato de Nortriptilina**.

Recomendação de uso

O **Cloridrato de Nortriptilina** é administrado nas doses de 75 à 100mg ao dia. O tratamento pode ser iniciado com doses menores, até chegar a posologia adequada. Em pacientes com depressão grave, podem ser administradas doses de até 150mg ao dia.

Para adolescentes e pacientes de terceira idade, recomenda-se doses menores de 30 à 50mg ao dia.

Efeitos Adversos

Os efeitos adversos mais comuns relacionados ao uso do **Cloridrato de Nortriptilina** são secura da boca, tremores, visão turva, retenção urinária. Sonolência também é uma reação frequente.

Precauções

O **Cloridrato de Nortriptilina** deve ser utilizado com precaução em pacientes com retenção urinária, hiperplasia prostática e tremores crônicos.

Obs: Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA – Lista C1.

Referências Bibliográficas:

1. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.
2. ANFARMAG; MANUAL DE EQUIVALÊNCIA. São Paulo/SP, 3ª Ed. 2010.
3. <http://www.bulas.med.br/bula/223245/cloridrato+de+nortriptilina.htm> – Acesso em 07/11/2013

Última atualização: 07/11/2013 MJD

