

USO: Externo

CAS: 1314-13-2

Fator de Correção: Não se aplica

FM: ZnO

Fator de Equivalência: Não se aplica

PM: 81,87 g/mol

DCB: 06730

Óxido de Zinco

Apresenta-se como um pó esbranquiçado, com propriedades anti-séptica, adstringente, secativa e anti-inflamatória. Usado também para aumentar o fator de proteção solar. O Óxido de Zinco é usado como protetor da pele e calmante nos casos de irritação.

Indicações

- Eczemas, escoriações e hemorróidas.
- Adjuvante no tratamento de úlceras e queimaduras.

Posologia

- Cremes e Loções cremosas: 2 a 10%
- Pastas aquosas: até 25%
- Talcos: 20 a 50%
- Aumentar o fator de proteção solar: 0,5 a 5%

Reações adversas

Podem ocorrer reações de hipersensibilidade, irritação da pele e de fotossensibilidade (sensibilidade à luz solar).

Precauções

Cuidado especial quando é aplicado em superfícies grandes, sobre pele sensibilizada ou queimada, mucosas, pele de recém-nascidos ou crianças pequenas.

Interações

Não foram relatadas interações medicamentosas.

Bibliografia

BATISTUZZO, José Antônio de Oliveira. Formulário Médico Farmacêutico. 3ªed. São Paulo: Pharmabooks, 2006.
Disponível em: < <https://www.indice.eu/pt/medicamentos/DCI/oxido-de-zinco/informacao-geral>>. Acesso 15 Dez. 2020.

Última atualização 15/12/2020 VS