

PODOFILINA

ANTIVIRAL, CONDILOMA ACUMINATO

A Podofilina é um agente com atividade antimicótica e cáustica. É empregado principalmente no tratamento tópico de verrugas anogenitais e condiloma acuminato, com aplicação sob a forma de soluções, veiculada no álcool ou tintura de benjoim. Veiculada também em óleo mineral (podofilina oleosa).

Durante a manipulação da Podofilina, é indispensável o uso de equipamentos de proteção individual (EPI's) e um manuseio cuidadoso, pois o item é irritante para mucosas.

Ações

- ✓ Antiviral;
- ✓ Antimicótica;
- ✓ Cáustica.

Recomendação de uso

A Podofilina é usada nas concentrações de 5 a 30%, em um prazo de até 6 semanas. Também é utilizada sob a forma de pomadas, sozinha ou associadas a outros queratolíticos, para a eliminação de verrugas plantares. Pode ser formulada também em óvulos vaginais, veiculados em PEG, na concentração de 0,2 a 0,5% para o condiloma acuminato.

Aplicar um óvulo diariamente, antes de se deitar, a critério médico. Pela manhã fazer lavagem ou ducha vaginal, para remoção dos resíduos do medicamento.

Aplicações

- ✓ HPV;
- ✓ Condiloma acuminado (verrugas venéreas) no trato genital inferior;
- ✓ Epiteliomatose múltipla superficial;
- ✓ Papiloma juvenil da laringe;
- ✓ Queratose pré-epiteliomatose.

Precauções

O risco de toxicidade sistêmica aumenta após sua aplicação tópica sobre grandes áreas com concentrações altas durante períodos prolongados, na terapia de verrugas que se rompem, sangram ou que tenham sido submetidas à biopsia recente e por aplicação sobre pele sadia ou membranas mucosas.

Referências Bibliográficas

1. BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/SP:Tecnopress, 3ª Ed. 2006.
2. P.R. Vade-Mécum. 10ªed. São Paulo: Soriak, 2004/2005.

Última atualização: 11/01/2012 JL