

USO: Interno

CAS: 8049-47-6

Fator de Correção: não se aplica

FM: N/A

Fator de Equivalência: não se aplica

PM: N/A

DCB: 06811

PANCREATINA 3 NF

ENZIMAS PANCREÁTICAS

Indicada para reposição de enzimas pancreáticas por secreção insuficiente e dificuldades na digestão. Estas enzimas são essenciais para que haja um aproveitamento adequado dos nutrientes ingeridos.

A pancreatina 3 NF é composta por lipase (atividade enzimática no mínimo 6 U USP/mg), amilase (atividade enzimática no mínimo 75 U USP/mg), protease (atividade enzimática no mínimo 75 U USP/mg); que promovem a hidrólise de gorduras, carboidratos e proteínas, respectivamente. A pancreatina é obtida a partir do pâncreas bovino ou suíno.

Indicações

A pancreatina é indicada para o tratamento da insuficiência enzimática pancreática exócrina de adultos e crianças. A insuficiência pancreática exócrina costuma estar associada, mas não exclusivamente, às seguintes situações:

- Fibrose cística;
- Pancreatite crônica;
- Pós-pancreatectomia;
- Gastrectomia;
- Câncer pancreático;
- Cirurgia de *by-pass* pós-gastrointestinal;
- Obstrução do ducto pancreático ou ducto biliar comum;
- Dispepsia e esteatorréia.

Posologia

É recomendado o uso de 400 mg a cada 6 horas. Caso necessário, a dose pode chegar a 6 ou 8 gramas ao dia.

Contraindicações

Não administrar este medicamento durante os estágios iniciais de pancreatite aguda. Não existem dados adequados sobre o uso de Pancreatina 3 NF na gestação.

Advertência

Manipulação em cápsulas ácido resistentes, uma vez que a secreção ácido-péptica gástrica inativa as enzimas.



Referências bibliográficas

- Martindale. Guia completo de consulta farmacoterapêutica. 1 ed. 2003.
- Disponível em: < <https://www.iberquimica.com.br/Arquivos/Insumo/arquivo-094011.pdf>>. Acesso 30 Set/20.

Última atualização: 30/09/2020 VS