

**Uso:** Interno

**Fator de Correção:** De acordo com o teor do laudo

**Fator de Equivalência:** 1,15

## **RISEDRONATO DE SÓDIO**

### **UM ALIADO CONTRA A OSTEOPOROSE**

### **É o primeiro medicamento que reduz o risco de fraturas decorrentes da osteoporose já no primeiro ano de tratamento**

**Risedronato Sódico**, primeira droga para o tratamento da osteoporose que possibilita a redução de fraturas logo após o primeiro ano de tratamento. O medicamento foi aprovado nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Canadá, Austrália e Argentina, e teve sua eficácia comprovada em um dos maiores programas de estudos clínicos já realizados, do qual participaram mais de 15 mil pacientes em 18 países.

Um importante benefício da nova droga é a posologia de apenas um comprimido diário, que pode ser administrado antes do almoço, e a ausência de efeitos colaterais agressivos - comum à maioria dos medicamentos que tratam da osteoporose. Os estudos clínicos não relataram efeitos colaterais graves, mesmo nos pacientes que tinham histórico de doenças gastrintestinais.

#### **Indicação**

É indicado para o tratamento e prevenção da osteoporose em mulheres no período pós-menopausa. É, também, indicado para manter ou aumentar a massa óssea nos homens e mulheres sob tratamento com corticosteróides sistêmicos a longo prazo.

#### **Reações Adversas**

Perturbações digestivas como dispepsia, náuseas, obstipação ou diarreia e dores abdominais. Em alguns casos cefaléias e dores musculoesqueléticas.

#### **Contra-Indicações e Precauções**

Os alimentos, bebidas e fármacos que contenham cátions polivalentes, tais como o cálcio, o magnésio, o ferro e o alumínio, não devem ser ingeridos com o medicamento por possível interferência na absorção.

Situações de hipocalcemia (baixo nível de cálcio no sangue) devem ser tratadas antes da terapêutica com o risedronato de sódio.

Recomenda-se o seguimento correto das posologias estabelecidas, particularmente em doentes com antecedentes de patologia esofágica. Não pode ser usado durante a gravidez nem aleitamento.

#### **Interações**

Com cálcio, magnésio, ferro e alumínio há redução da absorção.

#### **Posologia**

Via oral: 5 mg/dia ou 35 mg 1 vez/semana, 30 minutos antes do pequeno almoço. O medicamento deve ser ingerido com muita água para facilitar a chegada ao estômago. O paciente não deve deitar por 30 minutos após a ingestão.

#### **Referencias**

1. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.
2. <http://www.diagnosia.com/pt/droga/risedronato-de-sodio-germed>
3. <http://www.diagnosia.com/pt/droga/risedronato-de-sodio-parke-davis>

Última atualização: 17.07.2012 DP

