

Uso: Interno

PM: 400,40

Fator de Correção: Não se aplica

FM: C₁₄H₂₂N₂O₂.C₄H₆O₆

Fator de Equivalência: 1,60

RIVASTIGMINA BITARTARATO

PSICOTRÓPICO

Indicação

A **Rivastigmina Bitartarato** é um inibidor seletivo da colinesterase cerebral. Utilizada para o tratamento de pacientes com demência leve a moderadamente grave do tipo Alzheimer, também conhecida como doença de Alzheimer. Também utilizada para tratamento de pacientes com demência leve a moderadamente grave associada à doença de Parkinson.

Posologia

Utilizada posologicamente nas dosagens de 1,5 a 6 mg, duas vezes ao dia.

Efeitos Adversos

As reações adversas mais comuns com o uso da **Rivastigmina Bitartarato** são náuseas e vômitos. Agitação, tontura, sudorese, fadiga e perda de peso também são reações comumente relatadas.

Precauções

A **Rivastigmina Bitartarato** é contra indicado em pacientes com problemas graves no fígado. Não é recomendado para crianças.

Obs: Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA – Lista C1

Referências Bibliográficas:

1. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.
2. ANFARMAG; MANUAL DE EQUIVALÊNCIA. São Paulo/SP, 3ª Ed. 2010.
3. [http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM\[26120-1-0\].PDF](http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM[26120-1-0].PDF) – Acesso em 08/11/2013

Última atualização: 08/11/2013 MJD

