

Uso: Intero

PM: 342,68

Fator de Correção: Não se aplica

FM: C₁₇H₁₇Cl₂N.HCl

Fator de Equivalência: 1,12

SERTRALINA HCL ANTIDEPRESSIVO

Indicação

A **Sertralina** é um antidepressivo inibidor potente e seletivo da recaptação da serotonina. É bastante usado para o tratamento de depressão, com ou sem sintomas de ansiedade; transtorno obsessivo-compulsivo (TOC); transtorno do pânico e transtornos de ansiedade ou estresse pós-traumático. A **Sertralina** é também usada para tratamento de sintomas de tensão pré-menstrual.

A **Sertralina** é utilizada via oral, na forma de **Cloridrato de Sertralina**.

Posologia

O **Cloridrato de Sertralina** é indicado numa dose de 50mg ao dia. Dosagens de até 200mg diários podem ser aceitas em casos necessários.

Efeitos Adversos

As reações adversas mais comuns com o uso do **Cloridrato de Sertralina** são boca seca, sudorese, tonturas, tremores, diarreias, insônia ou sonolência e disfunção sexual.

Precauções

É recomendado precaução no uso do **Cloridrato de Sertralina** em casos de pacientes com insuficiência renal ou hepática. Não deve ser usado durante a gestação e amamentação.

Obs: Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA – Lista C1

Referências Bibliográficas:

1. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.
2. ANFARMAG; MANUAL DE EQUIVALÊNCIA. São Paulo/SP, 3ª Ed. 2010.
3. [http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM\[26071-2-0\].PDF](http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM[26071-2-0].PDF) – Acesso em 08/11/2013

Última atualização: 08/11/2013 MJD

