

**Uso:** Externo

**Fator de Correção:** Não se aplica

**Fator de Equivalência:** 1,00

**PM:** 334,3

**FM:** C<sub>17</sub>H<sub>26</sub>ClN.H<sub>2</sub>O.HCl

## **SIBUTRAMINA HCL** **PSICOTRÓPICO**

### **Indicação**

A **Sibutramina** é um fármaco inibidor da recaptção da serotonina e da norepinefrina. É usada para o tratamento da obesidade, para redução do peso. Também se utiliza em pacientes com sobrepeso quando há outros fatores de risco como hipertensão, diabetes e dislipidemia. Administra-se na forma de **Cloridrato de Sibutramina**.

### **Posologia**

Indicado na dosagem de 10 a 15mg ao dia, geralmente pela manhã.

### **Efeitos Adversos**

Os efeitos adversos mais comuns relatados com o uso do **Cloridrato de Sibutramina** são boca seca, cefaleia, insônia e tremores. Menos frequentemente pode causar diarreias e náuseas.

### **Precauções**

O tratamento com **Cloridrato de Sibutramina** não deve ser administrado durante mais de 1 ano. Não deve ser utilizado em pacientes com histórico de anorexia nervosa, bulimia e casos de hipertensão não controlada. Deve-se evitar o consumo de álcool durante o tratamento.

**Obs:** Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA – Lista B2

### **Referências Bibliográficas:**

1. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.
2. ANFARMAG; MANUAL DE EQUIVALÊNCIA. São Paulo/SP, 3ª Ed. 2010.

*Última atualização: 11/11/2013 MJD*

