

Uso: Interno

CAS: 54182-58-0

Fator de Correção: sim, de acordo com teor descrito no laudo.

FM: C₁₂H₅₄Al₁₆O₇₅S₈

Fator de Equivalência: Não se aplica

PM: 2086,67

SUCRALFATO

Agente gastrointestinal

O sucralfato é indicado para o tratamento de curto prazo (até 8 semanas) da úlcera duodenal ativa, úlcera gástrica e gastrite crônica. Este fármaco apresenta efeito citoprotetor devido à sua característica polianiónica. O sucralfato liga-se às proteínas de cargas positivas através da formação de um gel que adere à mucosa gástrica e duodenal, proporcionando uma proteção uniforme contra o ataque ácido, a pepsina e os sais biliares.

Dose:

- Úlcera duodenal:

Adulto: 1g v.o., a cada 6 horas. Manutenção 1g, v.o. a cada 12 horas. Tomar com estômago vazio 1 hora antes ou 2 horas após as refeições.

- Pediátrico (off-label): 40-80 mg/kg/dia, v.o. a cada 6 horas.

Precauções:

- Para pacientes com insuficiência renal, usar com cautela por causa do possível acúmulo de alumínio.
- Não tomar antiácidos dentro de 30 minutos da dose de sucralfato.
- Em pacientes com diabetes, tem sido relatado hiperglicemia.
- O sucralfato pode alterar a absorção de alguns fármacos. Portanto, deve ser tomado longe das outras medicações (2 horas de intervalo).

Contraindicações:

Hipersensibilidade ao medicamento.

Referências:

- Material do fornecedor.
- [Sucralfate: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions & Warnings \(rxlist.com\)](http://www.rxlist.com)

Última atualização: 15/03/2022 TC