

Uso: Externo

CAS: 15676-16-1

Fator de Correção: Não se aplica

PM: 341,4

FM: C₁₅H₂₃N₃O₄S

Fator de Equivalência: Não se aplica

DCB: 08210

SULPIRIDE ANTIDEPRESSIVO

Propriedades

Sulpiride é uma benzamida substituída com propriedades antipsicóticas que se descreve como um antagonista seletivo dos receptores centrais da dopamina (D2, D3 e D4). Também possui propriedades para melhorar o estado de animo.

A **Sulpiride** é utilizada fundamentalmente em tratamentos de psicoses como a esquizofrenia, também é utilizada nos tratamentos de síndrome de Gilles de Tourette, nos transtornos de ansiedade, vertigem e em úlcera péptica benigna.

Concentração de uso

Estados neuróticos depressivos – 100 a 200mg ao dia em 2 tomadas, pela manhã e à noite.

Síndrome vertiginosa – 150 a 300mg ao dia, em 2 tomadas.

Esquizofrenia – 400 a 800mg ao dia, em 2 tomadas.

Efeitos adversos

Pode ocasionar transtornos do sono e agitação. Os efeitos extrapiramidais se manifestam com frequência assim como a da clorpromazina, porém são normalmente leves.

Farmacocinética

Sulpiride é absorvido lentamente no tubo digestivo, a biodisponibilidade é baixa e está sujeita a variações individuais. Distribui-se rapidamente nos tecidos, mas sua passagem pela barreira hematoencefálica é lenta. Une-se as proteínas plasmáticas em uma proporção inferior a 40% e tem uma meia vida de eliminação plasmática de aproximadamente 8 a 9h. É eliminada pela urina e pelas fezes.

Obs: Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA – Lista C1

Referências Bibliográficas

1. BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/SP: Tecnopress, 3ª Ed. 2000.
2. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.

Última atualização: 20/08/2013 MJD

