

Uso: Interno

Fator de Correção: Não se aplica

Fator de Equivalência: 1,00

PM: 339,4

FM: C₁₂H₂₁NO₈S

TOPIRAMATO

PSICOTRÓPICO

Indicação

O **Topiramato** é um fármaco anticonvulsivante, eficaz no tratamento da epilepsia e na profilaxia da enxaqueca. O **Topiramato** influencia vários processos químicos no cérebro, reduzindo a hiperexcitabilidade de células nervosas, que pode causar crises epiléticas e crises de enxaqueca. É indicado para tratamento de pacientes com epilepsia, de crises epiléticas parciais, com ou sem generalização secundária.

Posologia

A dose mínima eficaz de **Topiramato** é 200 mg ao dia. Em geral, a dose total diária varia de 200 mg a 400 mg, dividida em duas tomadas. A dose máxima recomendada é de 1600mg ao dia.

O tratamento deve ser iniciado com 25-50 mg, administrados à noite, durante uma semana. Posteriormente, a intervalos de 1 ou 2 semanas, a dose deverá ser aumentada de 25 a 50 mg/dia e dividida em duas tomadas.

Efeitos Adversos

Os efeitos adversos relatados com o uso do **Topiramato** são ataxia, confusão, fadiga, sonolência, e problemas de memória e concentração. Também foram mencionados sintomas como agitação, ansiedade, nervosismo e instabilidade emocional.

Precauções

O **Topiramato** deve ser utilizado com precaução em pacientes com insuficiência renal ou hepática.

Obs: Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA – Lista C1

Referências Bibliográficas

1. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.
2. ANFARMAG; MANUAL DE EQUIVALÊNCIA. São Paulo/SP, 3ª Ed. 2010.
3. [http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM\[25835-1-0\].PDF](http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM[25835-1-0].PDF) – Acesso em 11/11/2013

Última atualização: 11/11/2013 MJD