

Uso: Externo

Fator de Correção: Não se aplica


Fator de Equivalência: 1,13

PM: 313,9

FM: C₁₇H₂₇NO₂.HCL

VENLAFAXINA HCL

PSICOTRÓPICO



Indicação

A **Venlafaxina** é usada para síndromes depressivas de grau variável, transtornos obsessivo-compulsivos e transtornos de ansiedade generalizada. É um derivado da feniletilamina e inibe a recaptção de serotonina, e norepinefrina, e ainda da dopamina. É administrada por via oral na forma de **Cloridrato de Venlafaxina**.

Posologia

Administradas em doses de 75 a 225mg/dia.

Efeitos Adversos

Cloridrato de Venlafaxina pode causar náuseas, diarreia, erupções cutâneas, anorexia, ansiedade, insônia, nervosismo, confusão mental, cefaléia, secura da boca e astenia.

Precauções

O **Cloridrato de Venlafaxina** deve ser empregado com precaução em pacientes com insuficiência renal e hepática, com devidos ajustes de doses.

Obs: Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA – Lista C1

Referências Bibliográficas:

1. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.
2. ANFARMAG; MANUAL DE EQUIVALÊNCIA. São Paulo/SP, 3ª Ed. 2010.
3. <http://pt.wikipedia.org/wiki/Venlafaxina> - Acesso em 29/10/2013

Última atualização: 29/10/2013 MJD.