

Uso: Interno

CAS: 590-46-5

Fator de Correção: Não se aplica

FM: $C_5H_{12}NO_2 \cdot Cl$

Fator de Equivalência: Não se aplica

PM: 153,61

BETAÍNA HCL

SUPLEMENTO CONTRA PROBLEMAS GASTROINTESTINAIS

O suco gástrico no organismo tem uma função importante de defesa e de digestão, ele consegue ser uma barreira para microrganismos e ao mesmo tempo auxilia na quebra dos alimentos para a liberação dos nutrientes, para que os mesmos possam ser absorvidos.

Diante dessas funções, a sua baixa no organismo pode representar alguns problemas, tanto infecções estomacais frequentes, quanto azia e má digestão. Um aliado é a Betaína HCl, que promove a digestão e encontra-se no nosso organismo, contudo sua concentração baixa retorna aos problemas da falta do suco gástrico.

A Betaína HCl, é essencial para o bom funcionamento da digestão e metabolismo dos alimentos, visto que ajuda o estômago a quebrar as gorduras e proteínas, além de auxiliar na absorção de vitamina B12.

Outro ponto relevante da Betaína é a sua função como liotrópico, ajudando a prevenir o acúmulo de gordura no fígado, desintoxica resíduos metabólicos e toxinas, ajudando até na perda de peso.

Recomendação de uso

É recomendado o uso de 0,3 a 2g ao dia, acompanhado de refeições que contenham proteínas.

A utilização e doses em crianças, deve ser à critério médico.

Apresentação

Pó cristalino branco.

Indicações

- ✓ Desordens do fígado e gastrointestinais;
- ✓ Hipopotassemia e alergias alimentares;
- ✓ Fonte de ácido clorídrico no tratamento da hipocloridria;
- ✓ Também para asma, candidíase e lúpus.

Vantagens

- ✓ Encontrado na forma endógena;
- ✓ Método alternativo para problemas de azia e má digestão;
- ✓ Auxilia na quebra de alimentos e proteção para o estômago;
- ✓ Método alternativo para alergias alimentares.

Mecanismo de ação

Cloridrato de betaína é uma forma ácida de betaína, uma substância similar à vitamina encontrada em cereais e outros alimentos. No estômago, o ácido hidrolórico converte pepsinogênio em pepsina, uma enzima que divide as proteínas em substâncias menores e mais facilmente absorvidas.



N.A.

Precauções

Uma alta quantidade de HCl pode destruir a membrana.
Se tiver uma sensação de ardor no estômago, suspender o uso.

Interações Medicamentosas

A Aspirina, outros medicamentos e anti-inflamatórios, como a cortisona, podem causar feridas no estômago. Logo, o uso destes medicamentos deve ser acompanhado pela descontinuação do consumo de HCl.

Obs.: Ocasionalmente, a Betaína (trimetilglicina) é recomendada para reduzir os níveis da substância Homocistina, associada às doenças do coração. Esta forma de Betaína é diferente da Betaína HCl.

Referências Bibliográficas

- ✓ Literatura do fabricante.
- ✓ Olthof MR et al. Journal of Nutrition 2003.

*Ultima atualização: 10/07/2017 BM.
18/06/2025 FPZ.*

