

Uso: Tópico

Fator de Correção: Não se aplica

Fator de Equivalência: Não se aplica

ACEPONATO DE HIDROCORTISONA

A dermatite atópica é uma doença de pele bastante comum em cães. Ela está relacionada a uma deficiência na barreira protetora da pele, o que permite que substâncias do ambiente sensibilizem o sistema imunológico do animal. Como resposta, ocorre uma reação exagerada do organismo, gerando inflamação e hipersensibilidade. Os principais sintomas incluem coceira intensa, pele ressecada e lesões na pele. Por isso, é necessário o uso de medicamentos que ajudem a controlar essa resposta inflamatória, como o Aceponato de Hidrocortisona.

O Aceponato de Hidrocortisona é um glicocorticoide, pertencente à classe dos corticoides, indicado para o alívio dos sintomas de inflamações e coceiras na pele dos animais. Apresenta baixo risco de causar efeitos colaterais sistêmicos (ou seja, no corpo todo). Como todo corticoide, sua ação envolve o bloqueio de substâncias inflamatórias, como as enzimas COX-1 e COX-2, além das prostaglandinas e leucotrienos — todos eles são importantes na origem da inflamação e da coceira, desta forma este medicamento também é indicado para outras doenças de pele inflamatórias.

Uma das vantagens do princípio ativo Aceponato de Hidrocortisona é que ele não se acumula na pele do animal, o que permite a ação local e eficaz mesmo em doses baixas. Sua eliminação ocorre naturalmente, através da urina e fezes.






Imagem: Molécula do **Aceponato de Hidrocortisona**, adaptado de
 <<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Hydrocortisone-aceponate#section=Structures>>

INDICAÇÕES

- Dermatite atópica;
- Dermatite alérgica a picada de pulga (DAPP);
- Manifestações cutâneas por lúpus;
- Dermatite de estase;
- Dermatite seborreica;

RECOMENDAÇÕES DE USO

Uso tópico na concentração de: 0,05% a 0,1%

Ou a critério do médico veterinário.

PRECAUÇÕES:

- Produto não deve ser aplicado sobre úlceras cutâneas (feridas abertas ou profundas na pele);
- Evitar o uso em animais que apresentem hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula;



- Infestações por ectoparasitas (como pulgas, carrapatos ou sarna) e infecções de pele que possam causar sinais dermatológicos devem ser descartados ou tratados previamente antes de iniciar o uso do medicamento;
- É fundamental consultar o médico-veterinário, que irá avaliar a condição da pele do animal e indicar o tratamento mais adequado de forma segura.

Referências:

1. BULA ECUPHAR. Anexo I: resumo das características do medicamento. Ecuphar. [S.l.], [s.d.]. Acesso em: 09 abr. 2025.
2. GEDON, Natalie Katharina Yvonne; MUELLER, Ralf Steffen. Atopic Dermatitis in cats and dogs: a difficult disease for animals and owners. *Clinical and Translational Allergy*, [S.l.], 2018. Acesso em: 09 abr. 2025.
3. HYDROCORTISONE ACEPONATE. DrugBank. Disponível em: <https://go.drugbank.com/drugs/DB14538>. Acesso em: 09 abr. 2025.
4. LOURENÇO, Ana M. et al. Efficacy of proactive long-term maintenance therapy of canine atopic dermatitis with 0.0584% hydrocortisone aceponate spray: a double-blind placebo-controlled pilot study. *Veterinary Dermatology*, v. 27, p. 88–e25, 2016. DOI: 10.1111/vde.12285. Acesso em: 09 abr. 2025.
5. SAUVÉ, Frédéric. Use of Topical Glucocorticoids in veterinary dermatology. *Veterinary Dermatology*, jul. 2019. Acesso em: 09 abr. 2025.
6. SOUZA, Bruna Carioca de et al. Dermatite atópica canina: revisão de literatura. Acesso em: 09 abr. 2025.

Última atualização: 08/10/2025 E.S.

